

Cartilasin®

Glukozamin je prekursor za nastanak supstanci koje su osnovni sastojci zglobne hrskavice, noktiju, kože i kose. U normalnim uslovima, ljudski organizam sam sintetishe dovoljne količine glukozamina. Međutim, sposobnost stvaranja glukozamina se smanjuje sa starenjem, kao i u slučajevima ponovljenih trauma zglobova, napornih sportskih aktivnosti, kod gojaznih osoba i češća je kod osoba ženskog pola.

Dokazano je da glukozamin odlaže degeneraciju hrskavice i potpomaže oporavak oštećenih tkiva i na taj način poboljšava funkcionisanje zglobova i smanjuje bol koji se javlja kod osteoartritisa. Takođe, glukozamin olakšava oporavak kod povreda mekih tkiva kao što je uganuće ili pucanje tetive. Glukozamin se dobija prepadom iz školjki i rakova.

Cartilasin je preparat koji obezbeđuje visok sadržaj glukozamina u poređenju sa ostalim preparatima iste grupe.

Sastav: 1 tableta Cartilasina sadrži 500 mg glukozamin hidrohlorida

Cartilasin:

- Doprinosi oslobađanju od bola
- Povećava pokretljivost zglobova
- Deluje antiinflamatorno
- Deluje hondroprotektivno
- Usporava tok degenerativnih reumatskih oboljenja

Primena:

Cartilasin se preporučuje svim osobama iznad 30 godina života kod kojih su prisutni faktori rizika:

- *Ponovljene traume zglobova*
- *Gojaznost*
- *Naporne sportske aktivnosti*
- *Osobe ženskog pola*

Cartilasin se preporučuje svim osobama iznad 50 godina života sa dijagnozom degenerativnih reumatskih oboljenja:

- *Analgetski efekat Cartilasina pri kontinuiranoj upotrebi je efikasniji i dugotrajniji u poređenju sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima*
- *Cartilasin je preparat izbora kod pacijenata sa izraženim neželjenim efektima na primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova*
- *Cartilasin kao deo kombinovane terapije dovodi do smanjenja doze nesteroidnih antireumatskih lekova*

Primena Cartilasina je preporučena u slučajevima:

1. degenerativnih reumatskih oboljenja
2. artritisa različite etiologije
3. vanzglobnih reumatskih oboljenja
4. sportskih povreda
5. i kao simptomatska terapija kod osteoporoze

Doziranje: 3 X 1 tableta pre jela tokom 6 nedelja

Mere opreza: Cartilasin se ne preporučuje osobama koje su alergične na plodove mora (rakove, školjke...).

Dijabetičarima se preporučuje redovna kontrola glikemije tokom korišćenja preparata.

Korišćenje Cartilasina se ne preporučuje u trudnoći i tokom dojenja.

Pakovanje: kutija sa 30 ili 60 tableta